## Bocage du Poitou

## Description

## Localisation en Nouvelle-Aquitaine



Le bocage est un type de paysage rural où les prairies et les cultures, avec ou sans mares, sont entourés par des haies ou des rangées d'arbres qui marquent les limites de chaque parcelle. Cette association caractéristique fait la richesse du bocage sur le plan biologique. Principalement localisé dans les Deux-Sèvres, le bocage du Poitou forme différent ensemble bocager : le bocage de Gâtine, le bocage des terres froides et le bocage du marais poitevin.

Bocage de Gâtine: au sud-est du massif Armoricain, le bocage des Deux-Sèvres comprend deux secteurs distincts : le Bocage Bressuirais à l'ouest et la Gâtine de Parthenay à l'est. Le paysage est de type collinaire et e bocage repose sur plusieurs formations géologiques : dépôts sédimentaires et socle granitique en fond de vallée laissant ressortir des falaises, pans de rochers ou chaos granitiques. Le bocage des Antonins (RNN) est représentatif d'un bocage de Gâtine en bon état de conservation. Il est composé d'un étang, de plusieurs mares, de sources, de prairies de fauche plus ou moins humides ou de pâturage extensif, de boisements pluri-centenaires, de fourries, d'arbres têtards...

Bocage des terres froides : les terres froides évoquent les terres de transition vers les paysages du Massif Central. Elles accueillent un relief fortement vallonné. La roche granitique apparaît parfois, tapissant les rivières ou affleurant à la surface des prés. Le réseau hydrographique est dense. Le sol argiteux maintent l'eau de ruissellement en surface qui imprègne les prés et alimente un nombre important de mares sur ces rivières ou affleurant à la surface des prés. Le réseau hydrographique est dense. Le sol argiteux maintent l'eau de ruissellement en surface qui imprègne les prés et alimente un nombre important de mares sur ces rois est de prairies sont ponctives d'arbres isolés ou de successions de petits boisements aux formes très découpées, connectée sentre eux par un réseau de haies plus ou moins continu. Le parcellaire occupe des surfaces d'importance inégale du fait de

## Reptiles & Amphibiens potentiellement présents



Orvet fragile Anguis fragilis



Lézard des murailles



Lézard à deux raies Lacerta bilineata



Coronelle lisse Coronella austriaca



Coronelle girondine Coronella girondica



Vipère aspic



Couleuvre vipérine



Couleuvre helvétique



Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus



Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus



Pélodyte ponctué Pelodytes ponctatus



Alyte accoucheur Alytes obstetricans



Crapaud épineux Bufo spinosus



Grenouille agile Rana dalmatina



Grenouille rousse Rana temporaria



Pelophylax lessonae



Grenouille de Lessona Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus



Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus



Rainette verte Hyla arborea



Salamandre tachetée Salamandra salamandra



Triton palmé Lissotriton helveticus



Triton crêté



Triton marbré





























# Bocage du Poitou

#### Menaces et conservation

Depuis les années 1960, les paysages bocagers ont fortement été modifiés avec une tendance majeure à la régression des prairies et à la croissance des grandes cultures : régression de la polyculture au profit des cultures comme le maïs, le blé dur, le tournesol ou le colza. Ces bouleversements ont contribué à faire disparaître progressivement les prairies, les haies, les chemins isolés, les mares...

Une étude, réalisée par l'Institut Atlantique d'Aménagement du Territoire (IAAT) au sujet de l'évolution du linéaire de haies dans les grandes entités paysagères régionales entre 1960 et 2000, a montré que le linéaire de haies s'est réduit de plus de 35 000 km, soit - 36 % entre les deux dates d'étude. Cette emprise croissante des terres cultivées, une mauvaise gestion de l'eau ainsi que l'expansion d'espèces exotiques envahissantes (Ecrevisse de Louisiane, Jussie des marais) sont autant de menaces qui peuvent compromettre le bon épanouissement des espèces végétales et animales au sein du marais poitevin. Le bocage continue de disparaître malgré la prise de conscience des intérêts qu'il présente (régulation hydraulique, conservation des sols, zones de refuge et d'alimentation pour la faune, corridor écologique...).

## Espèces à fort enjeu

## Tendance évolutive Déclin



#### **Orvet fragile** Anguis fragilis

L'Orvet fragile est présent dans toutes les régions de France mais sa répartition est hétérogène. En Deux-Sèvres, il est assez rare et essentiellement localisé sur le massif armoricain dans les secteurs bocagers et les massifs forestiers. L'espèce semble souffrir de la fragmentation et de la disparition de ses habitats.

#### Vipère aspic Vipera aspis

La Vipère aspic est rare dans le bocage du Poitou. Autrefois abondante, elle est de plus en plus localisée au sein des bocages préservés et des massifs forestiers. Elle souffre de la destruction de ses habitats (lisières, bocages, fermeture des milieux) et de la destruction directe par peur, ignorance ou superstition.





#### **Triton marbré** *Triturus marmoratus*

Associé aux bocages préservés, il fréquente divers types de plans d'eau, souvent profonds et riches en végétation. Il souffre de la modification et de la fragmentation de ses milieux de vie (agriculture et sylviculture intensives) ainsi que de la disparition des zones aquatiques.

### Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae

Rare et menacée, c'est une espèce typique des bocages, où n'est présente que de manière très localisée. La modification de ses milieux de vie (retournement de prairies pour la mise en culture et comblement de mares) constitue une menace pour sa conservation.

























